

Vacunarse es **cuidarse**

Y también es la forma
segura de prevenir
enfermedades graves.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Edad	Vacuna	Dosis	Enfermedad que previene
 Recién nacido	BCG Hepatitis B	Única De recién nacido	Meningitis tuberculosa. Hepatitis B.
 A los 1.5 meses	Pentavalente: difteria, <i>B. pertussis</i> , tétanos (DPT)	Primera	Difteria, tosferina, tétanos.
	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b.
	Hepatitis B		Hepatitis B.
	Polio inyectable (VIP)	Primera	Poliomielitis.
	Rotavirus		Gastroenteritis (diarrea) por rotavirus.
	Neumococo		Neumonía, otitis y meningitis por neumococo.
 A los 3 meses	Pentavalente: difteria, <i>B. pertussis</i> , tétanos (DPT)	Segunda	Difteria, tosferina, tétanos.
	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b.
	Hepatitis B		Hepatitis B.
	Polio inyectable (VIP)	Segunda	Poliomielitis.
	Rotavirus		Gastroenteritis (diarrea) por rotavirus.
	Neumococo		Neumonía, otitis y meningitis por neumococo.
 A los 4.5 meses	Pentavalente difteria, <i>B. pertussis</i> , tétanos (DPT)	Tercera	Difteria, tosferina, tétanos.
	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b.
	Hepatitis B		Hepatitis B.
	Polio inyectable	Tercera A esta edad se da inicio a la aplicación.	Poliomielitis.
	COVID-19		COVID-19.
 A los 6 meses	Influenza estacional	Primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.
 A los 7 meses	Influenza estacional	Segunda	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.
 A los 9 meses	Fiebre amarilla (FA)	Única	Fiebre amarilla.

Edad

Vacuna

Dosis

Enfermedad que previene



A los 12 meses

Sarampión, rubéola, paperas.
(SRP o triple viral)

Varicela

Neumococo

Hepatitis A

Influenza estacional

Primera

Primera

Refuerzo

Única

Anual

Sarampión, rubéola y parotiditis.

Varicela.

Neumonía, otitis y meningitis por neumococo.

Hepatitis A.

Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.



A los 18 meses

Polio inyectable (VIP)

Sarampión, rubéola, paperas.
(SRP o triple viral)

Pentavalente

Primer refuerzo

Segunda

Primer refuerzo
Se aplica hasta los 23 meses y 29 días.

Poliomielitis.

Sarampión, rubéola y parotiditis.

Hepatitis B, *Haemophilus influenza* tipo B, Difteria, tosferina, tétanos.



A los 5 años

Difteria, *B. pertussis*, tétanos (DPT)

Varicela

Polio inyectable (VIP)

Segundo refuerzo

Refuerzo

Segundo refuerzo

Difteria, tosferina, tétanos.

Varicela.

Poliomielitis.



Niños de 9 a 17 años

Virus del papiloma humano (VPH)*

Dosis única

Cáncer de pene, de ano, de boca, de garganta y orofaríngeo.



Niñas de 9 a 17 años

Virus del papiloma humano (VPH)*

Dosis única

Cáncer de cuello uterino, de ano, de boca, de garganta y orofaríngeo.



Mujeres en edad fértil, entre los 10 y 49 años

Toxoide tetánico y diftérico (Td)**

Td1: dosis inicial
Td2: al mes de Td1
Td3: a los 6 meses de Td2
Td4: al año de la Td3
Td5: al año de la Td4

Difteria, tétanos y tétanos neonatal.



Gestantes

Influenza estacional

Tdap (tétanos, difteria, tosferina acelular)

COVID-19

Virus sincitial respiratorio (VSR)

Una dosis a partir de la semana 14 de gestación

Dosis única a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo

Dosis adicional semana 12 de gestación

Dosis única entre las semanas 28 y 36 de gestación

Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.

Tétanos neonatal, difteria, tosferina.

COVID-19.

Enfermedades de las vías respiratorias bajas causadas por el VSR.



Adultos de 60 y más años

Influenza estacional

COVID-19

Anual

Dosis adicional

Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.

COVID-19.