Esquema de **vacunación**

Vacunarse es **cuidarse**

Es también la forma segura
de prevenir enfermedades
y salvar vidas.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Vacunarse es **cuidarse**










Edad	**Recién nacido** (0 a 29 días)	**A los 1.5 meses** (6 semanas)	**A los 3 meses** (12 semanas)	**A los 4.5 meses** (18 semanas)
Vacuna	BCG HEPATITIS B	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) Hepatitis B Polio Rotavirus Neumococo	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) Hepatitis B Polio Rotavirus Neumococo	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) Hepatitis B Polio
Dosis	Dosis Única (BCG) Recién nacido (Hepatitis B)	Primera (DPT, Hib, Hepatitis B) Primera (Polio) Primera (Rotavirus) Primera (Neumococo)	Segunda (DPT, Hib, Hepatitis B) Segunda (Polio) Segunda (Rotavirus) Segunda (Neumococo)	Tercera (DPT, Hib, Hepatitis B) Tercera (Polio)
Enfermedad que previene	Meningitis tuberculosa Hepatitis B	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo B Hepatitis B Poliomielitis Diarrea por Rotavirus Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus Influenzae tipo B Hepatitis B Poliomielitis Diarrea por Rotavirus Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por *Haemophilus Influenzae* tipo b Hepatitis B Poliomielitis

Vacunarse es **cuidarse**









Edad	**6 meses**	**7 meses**	**9 meses**	**12 meses**
Vacuna	Influenza estacional* COVID 19 SRP	Influenza estacional*	Fiebre Amarilla (FA)	Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) Varicela Neumococo Hepatitis A
Dosis	Primera (Influenza estacional*) A esta edad se da inicio a la aplicación (COVID 19) Dosis 0 (SRP)	Segunda (Influenza estacional*)	Única	Primera (SRP) Primera (Varicela) Refuerzo (Neumococo) Única (Hepatitis A)
Enfermedad que previene	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza COVID 19 Sarampión - Rubeola - Paperas	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	Fiebre Amarilla	Sarampión - Rubeola - Paperas Varicela Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia Hepatitis A

Vacunarse es **cuidarse**

Edad	18 meses	5 años	Niños de 9 a 17 años	Niñas de 9 a 17 años
				
Vacuna	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) Hepatitis B Polio Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT) Polio Varicela	Virus del Papiloma Humano (VPH)	Virus del Papiloma Humano (VPH)
Dosis	Primer refuerzo (DPT, Hib, Hepatitis B) Primer refuerzo (Polio) Segunda dosis (SRP)	Segundo refuerzo (DPT) Segundo refuerzo (Polio) Refuerzo (Varicela)	Única (VPH)	Única (VPH)
Enfermedad que previene	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por *Haemophilus Influenzae* tipo b Hepatitis B Poliomielitis Sarampión - Rubeola - Paperas	Difteria - Tos ferina - Tétanos Poliomielitis Varicela	Cáncer de pene, de ano, de boca, de garganta y orofaríngeo	Cáncer de cuello uterino, Cáncer de pene, de ano, de boca, de garganta y orofaríngeo

Vacunarse es **cuidarse**







Edad	**Jóvenes entre 10 y 17 años**	**Mujeres en Edad Fértil (MEF)** entre los 10 y 49 años	**Gestantes**
Vacuna	SR	Toxoide tetánico y diftérico del adulto (Td)***	Influenza estacional TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular) COVID 19 Vacuna VSR
Dosis	Dosis adicional	Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de Td3 Td5: al año de Td4 Refuerzo cada 10 años	Una dosis a partir de la semana 14 de gestación en cada embarazo (Influenza estacional) Dosis única a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo (TdaP) Una dosis a partir de la semana 12 de gestación en cada embarazo (COVID 19) Dosis única entre las semana 28 y 36 de gestación (Vacuna VSR)
Enfermedad que previene	Sarampión - Rubeola	Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina del recién nacido Covid virus sincitial respiratorio

Vacunarse
es **cuidarse**





Edad	**Viajeros internacionales**	**Adultos de +60 años**
Vacuna	Fiebre amarilla SR	Influenza estacional COVID 19
Dosis	Mínimo 14 días antes del viaje, dosis única. Refuerzo solo en casos especiales (Fiebre amarilla) Mínimo 14 días antes del viaje, dosis única (SR)	Anual (Influenza estacional) Dosis adicional (COVID 19)
Enfermedad que previene	Fiebre amarilla Sarampión - Rubeola	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza COVID 19

Vacunarse es una decisión que hace la diferencia.

Con cada dosis, reduces el riesgo de enfermedades y proteges a quienes más quieres.

¡Súmate al cuidado y completa tu esquema de vacunación!

Escanea el código QR y conoce **los puntos de vacunación** del Distrito.

Vacunarse
es **cuidarse**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación